

OFT BELÄSTIGEN MÄNNLICHE SCHILDKRÖTEN WEIBCHEN ODER ANDERE MÄNNCHEN IN EINEM AUSMASS, DASS DIE TIERE GETRENNT WERDEN MÜSSEN. IN EINIGEN FÄLLEN KOMMT ES DESHALB SOGAR ZU VERLETZUNGEN.



Eine grosse gut strukturierte Anlage, mit vielen Versteckmöglichkeiten, kann dieses Problem in einigen Fällen reduzieren.

Als langfristige Lösung kommt jedoch oft nur die Kastration in Frage.

Nach der Kastration werden die Schildkröten ruhiger und verträglicher untereinander.

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Schildkröte kastrieren zu lassen, können Sie uns per Email oder Telefon kontaktieren.


Vor der Kastration findet jeweils ein Kontrolltermin statt, um sicherzustellen, dass Ihre Schildkröte gesund ist.

MINIMALINVASIVE KASTRATION

- In Allgemeinanästhesie
- Inguinaler Zugang auf jeder Seite
- Ligation der Gefässe mit Gefässclips
- Endoskopische Entfernung der Hoden

NACH DER OPERATION

- Zur Kontrolle bis am nächsten Tag stationär
- Zwei kleine Nähte inguinal
- Entfernung der Fäden nach 4-6 Wochen





MED. VET. MARIE BRANQUART